

ELSŐ SZAKASZ ... KOMPLIKÁCIÓMENTES TÜDŐGYULLADÁS KEZELÉSE - Douglas Borland: Tüdőgyulladások kezelése c. munkájából

SZER	KEZDET	ARCSZÍN/HŐM.	NYELV/SZÁJ/PULZUS	KÖHÖGÉS	KÖPET	SZOMJÚSÁG	MODALITÁSOK	MENTÁLIS ÁLL.	KÜLÖNÖS KULCSTÜNET
ACONITUM	Hirtelen	Arc: élénkvörös	Nyelv: száraz és világos	Száraz, állandó, rövid a	Gyér	Nagyon szomjas, hideg	A hátán fekvé jól felpolcolva	Nyughatatlan	Pupillák összehúzódtak, főként az első 24 órában
	Heves	Erőteljesen kipirult	vagy tiszta	száraz torokból	Élénkvörös vérrrel	italok javulást hoznak	javul	Akut szorongás	
		Bőr: forró, száraz	Száj: forró/bizsergő	Szűrő, éles fájdalom,	csíkozott		Bal oldalon fekvé	Halálfélelem	
		Végtagok: hidegek	Pulzus: gyors/ugráló	köhögéstől rosszabbodik			rosszabbodik		
	Láz: magas		Tüdő: bal oldal				Késő este/éjszaka rosszabb		

FERRUM PHOS.	Lassabb	Arc: kipirult köhögés alatt (arcsont)	Nyelv: sötétvörös	Szüntelen, állandó	Élénkvörös vérrrel	Szomjas, hideg italok	Bármilyen mozgás fájdalmas	Érzékeny a zajokra	Orrvérzés köhögés után
		máskülönben sápadt	Duzzadt	Kínzó (szegycsont mögötti	csíkozott	javítanak	(tüdő)	Nyugalomra, csendre	Más szakaszokban is
		Száj körüli sápadtság	Fázékonyság	irritációtól)		Édeskés szájíz	Hajnali 4-től 6-ig	vágyik	szükség lehet rá.
		Láz: alacsony	Pulzus: gyors/ugráló	Éles mellkasi fájdalom		(savanyú javít)	rosszabbodás		

BELLADONNA	Hirtelen	Arc: élénkvörös	Nyelv: sötétvörös	Száraz, fájdalmas, kínzó	Gyér	Nem szomjas	Nem tud az érintett	Izgatott/sírós	Kitágult pupillák
	Heves	Bőr: forró, égő	Száj: száraz/forró/égő	A mellkas érzékeny			oldalon feküdni	Nyughatatlan	Fényérzékenység
		Láz: magas(nagyon)	Pulzus: ugráló	Köhögés, érintés rontja			Erős fény ront	Téveszme, dolgokat lát	Főként az első 36 órában
				Tüdő: jobb oldal (vagy bal)			Sötét szobában javul		
						Mozgás ront (köhögés)			

IPECACUANHA	Lassabb	Arc: kipirult/dusky	Száj: ragadós	Fulladásos görcs	Bőséges	Nem szomjas	Nem szereti a füledt szobát	Szerencsétlen/beteg	Gyomorideg
		Köhögés után sápadt	Nyelv: tiszta	Köhögés rohamok	Nehéz felköhögni		Szabad levegőn javul	Kimerült	Hányás köhögés előtt
		Ajak: vértelenek	(vagy vastagon bevont)	Köhögés öklendezéssel	Szállagos, rostos			Nehéz a kedvében járni	Tüsszögési roham
		Bőr: Forró/izzadt		Recsegő	Vércsíkos			Elutasítja az általa kért dolgokat	
	Láz: mérsékelt								

Aconitum vs. Ferrum phos.

Hasonlóság: pulzus, láz, szomjúság, édeskés íz

Különbségek: NYELV (acon: halvány, ferr-p: sötétvörös) ... ÉRZÉKENYSÉG (acon: torok, ferr-p: szegycsont) ... ALKALMAZÁS (acon: az első 24-36 óra, ferr-p: az első 3+ nap)

A Ferrum phos. FÁRADTABB, egyedül/csendben szeretne lenni | Az Aconitum RÉMÜLT, különösen halálfélelme van, szüksége van valakire a közelében

Aconitum vs. Belladonna

Hasonlóság: kezdet, vörös arc, magas láz

Különbségek: pupillák (fényérzékenység), szomjúság, oldaliság (tüdő)

Az Acon. Szorongóbb, rémült, halálfélelme van, a Belladonna inkább delirál/izgatott és sír

Összeállította: Fi Connors és Miranda Castro

Fordította: Tuscher Ágnes

Szerkesztette: Hassmann Péter